

Ketoazidose-Schema

Bei Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und/oder BZ über 250
 (mehr als doppelt so hoch wie normal)

Aceton im Urin testen

Aceton -bis +

Aceton -bis ++
Trinken möglich

Aceton -bis ++
Trinken nicht möglich

BZ-Korrektur wie
üblich,

Holen Sie sich Hilfe,
Sie dürfen nicht
einschlafen

Sofort Diabetologie,
Sonst Klinik!
Komagefahr!
Sie brauchen Infusionen

Sofort hintereinander 2l Wasser oder Tee trinken und 20%
der Tagesgesamtdosis Insulin als kurzwirksames Insulin spritzen

Nach 2 Stunden Kontrolle Blutzucker und Urin auf Ketone

Blutzucker über 250mg/dl
Und cAceton ++/+++

Blutzucker unter 250mg/dl
und Aceton +/-

Erneut 2 L Wasser oder Tee trinken
und 20% der Tagesgesamtdosis Insulin
als kurzwirksames Insulin spritzen,
Nach 2 Stunden erneut messen

1 Liter Wasser oder Tee trinken + 10%
der Tagesgesamtdosis als Kurzwirk-
sames Insulin spritzen, Nach 2
Stunden erneut messen

So berechnen Sie ihre Tagesgesamtmenge Insulin:
 Summe Basalinsulin (morgens, abends) E: ___
 Summe Bolusinsulin (morgens, Mittags, Abends) E: ___
 Tagesgesamtmenge Insulin Summe: E: ___
 20 % davon aufgerundet: E: ___
 10 % davon aufgerundet: E: ___

BZ unter 180 mg/dl und
Aceton – bis +

Jetzt kein Insulin mehr, Gefahr der
Unterzuckerung → 2-3 BE essen,
Gefahr vorbei

Erforschen Sie die Ursachen der Entgleisung!!
 Insulin vergessen, Spritzfehler, technisches Problem, Infekt...